

INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL

Ações e cuidados no enfrentamento à COVID-19

CHECKLIST PARA INTUBAÇÃO - Conforme estruturação da Med. Alessandra Dziekaniak (SAMU/RG/RS)

DROGAS

- **Lidocaína** 2% sem vasoconstritor
 - 1 frasco
 - 1 seringa 10 ml
- **Fentanil** (50mg/ml)
 - 1 frasco ampola
 - 1 seringa 10 ml
- **Midazolam** (15mg/ml) 1 ampola
 - 1 frasco
 - 1 seringa 3 ml
- **Cetamina**
 - 3 frascos
 - 1 seringa 5 ml
- **Succinilcolina**
 - 2 frascos(diluir cada frasco em 10 ml)
 - 2 flaconetes de água destilada 10 ml
 - 1 seringa de 20 ml
- Abocath
- Dânuia
- Equipo
- Soro Fisiológico 0,9% 500 ml
- Agulha 40x12 (para aspirar)

EQUIPAMENTOS PARA INTUBAÇÃO

- Laringoscópio (lâminas curvas 4 e 5, lâmina reta 4);
- TOT (7,0 a 8,5) - 1 de cada
- Máscara Laríngea (4 ou 5) - 1 de cada
- Pinça forte
- Fio guia
- Cadarço para fixar o TOT
- 1 seringa de 20 ml (para inflar o cuff)
- 1 embolo de seringa de 5 ml
- 1 borracha de êmbolo de 20 ml furado
- Lidocaína gel

Ventilador

- Filtro HMEF no Y (ou 2 filtros HME, 1 no filtro e um na via respiratória)
- Traqueias
- Peça em Y
- Linha de pressão
- Membrana metálica
- Conector da via expiratória

DROGAS (Possível usar calculadora)

(<https://emergenciarules.com/wp-content/uploads/2020/03/covid.html>)

				Dose final em ml conforme o peso					
				50	60	70	80	90	100
1)	2-3mcg/kg	50mcg/ml	Fentanil	2	3	4	5	5,5	6
	1,5 mg/Kg	20mg/ml	Lidocaína*	3,5	4,5	5	6	6,5	7,5
2)	1-2mg/Kg	50mg/ml	Cetamina ou	2	2,5	2,5	3	3,5	4
	1-2mg/Kg	10ml/ml	Propofol ou	10	12	14	16	18	20
	0,1-0,3mg/Kg	5mg/ml	Midazolam	2	3	3	3	4	4
3)	1-1,5mg/Kg	10mg/ml	Succinilcolina (frasco de 100mg 10 ml diluente)	8	9	11	12	14	15



*Obs:as doses são aproximadas, pensando em facilitar a execução. Se Lidocaína 1%, dobrar a dose.