

A partir de quinta feira, 14 de outubro, pessoas com alto grau de imunossupressão deverão receber uma dose reforço ao esquema de vacinação. Dessa forma, pessoas vacinadas há mais de trinta dias, com segunda dose de qualquer uma das vacinas para Covid-19 disponíveis, poderão comparecer aos Postos de Vacinação para receberem a aplicação. Para isso deverão levar Documento de Identidade com foto, CPF, Cartão SUS, Carteira de Vacinação impressa onde estão registradas as doses recebidas anteriormente e comprovante da comorbidade que pode ser atestado médico com a indicação da comorbidade, receita médica ou resultado de exames de acompanhamento ou diagnóstico. Segue abaixo as doenças relacionadas para esta fase de vacinação:

I - Imunodeficiência primária grave.

II - Neoplasia em tratamento;

III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas

IV - Pessoas vivendo com HIV/AIDS.

V - Uso de corticóides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias.

VI - Pacientes em hemodiálise.

VII - Uso de drogas modificadoras da resposta imune conforme relação abaixo:

* Metotrexato

* Leflunomida

* Micofenolato de mofetila

* Azatioprina

* Ciclofosfamida

* Ciclosporina

* Tacrolimus

* 6-mercaptopurina

* Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe)

* Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe)